

КЛИНИЧЕСКИЕ ТРЕВОЖНЫЕ ФЛАГИ

КРАСНЫЕ ФЛАГИ	ОРАНЖЕВЫЕ ФЛАГИ	ЖЕЛТЫЕ ФЛАГИ
Признаки серьезной патологии у ребенка	Признаки насилия или нарушения психического здоровья у основного ухаживающего	Признаки психосоциальных нарушений у основного ухаживающего или ребенка
<p>Общие симптомы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Боли при перемещении • Боль • Быстрое увеличение окружности головы • Возрастание спастичности • Вынужденное положение головы • Изменение вокализаций / речи • Изменение размера зрачков • Меняющееся двигательное поведение • Неясная лихорадка • Отказ от еды / жидкости • Пролезни • Раздражение • Рвота • Регресс в развитии • Синяки и следы иных повреждений • Снижение веса / отсутствие прибавки веса • Снижение зрительной активности • Сонливость / вялость • Судороги • Цианоз / иные изменения цвета кожи и слизистых <p>Симптомы дисфагии</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вытекание пищи / жидкости через нос • Давится во время еды • Закашливается во время еды • Захлебывается пищей / жидкостью 	<ul style="list-style-type: none"> • Агрессия • Апатичность, подавленность • Выраженные колебания намерений • Выраженные колебания настроения • Крайне выраженная тревога, ведущая к дезадаптации • Невозможность концентрировать внимание • Нелогичность умозаключений • Несвязная речь • Отсутствие сна • Повторяющиеся навязчивые действия / ритуалы • Признаки алкогольной / наркотической зависимости • Приступы паники • Следы побоев / иные повреждения • Ухудшение понимания / значимый объем «выпадения» информации • Сонливость • Спутанность сознания • Суицидальные мысли 	<p>Основной ухаживающий</p> <ul style="list-style-type: none"> • Боязнь дотронуться до ребенка • Дергает / встряхивает / излишне энергично укачивает ребенка • Кричит на ребенка • Не ждет ответа или реакции ребенка • Не играет с ребенком • Не смотрит на ребенка / не отвечает ребенку • Не хвалит ребенка • Неадекватное длительное укачивание • Нереалистичные ожидания • Оскорбительные высказывания по отношению к ребенку • Отсутствие телесного контакта / мать не берет ребенка на руки • Пренебрежение базовыми потребностями ребенка • Признаки хронического стресса • Признаки эмоциональной нестабильности • Сложно прервать контакт с ребенком даже на короткое время • Физическое насилие над ребенком <p>Ребенок</p> <ul style="list-style-type: none"> • Длительный плач и неспособность успокоиться • Замирает, прерывая деятельность • Избегание контакта с близким

- Значительное усилие при глотании
- Непереваренные остатки пищи в стуле
- Плач и беспокойство после срыгивания / скрытого рефлюкса / рвотных движений
- Проглатывание пищи без жевания
- Явное срыгивание / скрытый рефлюкс / рвотные движения с закрытым ртом без отрыжки или рвоты

Костно-мышечные нарушения

- Дефлексия бедер в привычной позе лежа
- Дефлексия бедер в привычной позе сидя
- Изменение очертания сустава / области тела
- Кифоз
- Ограничение движений в суставе
- Разная длина конечностей
- Сколиоз

Симптомы дыхательных нарушений

- Апноэ
- Аритмичное дыхание
- Затрудненное дыхание
- Кашель
- Учащенное дыхание
- Хрипящие / булькающие звуки при дыхании

- Нарушение сна
- Не демонстрирует эмоций
- Не переносит отсутствие физического контакта с матерью
- Не смотрит на взрослого
- Неразборчивое дружелюбие
- Постоянная апатия
- Самоповреждающее поведение
- Самостимуляция
- Агрессивное поведение
- Следы побоев / иные повреждения
- Тело напряжено

© АНО «Физическая реабилитация» (СПб), 2016

© И. Джаошвили, Е. Клочкова, А. Рязанова, О. Пальмов, 2016